

Kapljice za uho, 20 mg/0,4 mg v 1 g kapljice za uho, raztopina lidokainijev klorid/etakridinijev laktat monohidrat

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Kapljice za uho in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice za uho
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice za uho
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kapljice za uho
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KAPLJICE ZA UHO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Kapljice za uho vsebuje zdravilni učinkovini etakridinijev laktat in lidokainijev klorid. Etakridinijev laktat deluje antiseptično, lidokainijev klorid pa lokalno anestetično, zaradi česar blaži bolečino.

Kapljice za uho uporabljamo za lajšanje bolečin v ušesu, ki spremljajo vnetni proces.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KAPLJICE ZA UHO

Ne uporabljajte zdravila Kapljice za uho:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) katero koli sestavino tega zdravila (glejte poglavje 6),
- po operaciji ušesa ali v primeru cevki v ušesu, razen če vam je tako svetoval zdravnik,

- pri poškodovanem bobniču.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Če se pojavi močnejša bolečina v ušesu, večja izguba sluha ali povišana telesna temperatura (vročina), se posvetujte z zdravnikom. Z zdravnikom se posvetujte tudi, če se med zdravljenjem znaki vaše bolezni poslabšajo. Kapljic za uho ne uporabljajte za oči in jih ne zaužijte!

To zdravilo vsebuje propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože.

Otroci

O uporabi zdravila Kapljice za uho pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.

Nosečnost in dojenje

Zdravilo Kapljice za uho ni primerno za uporabo v času nosečnosti. O varnosti uporabe tega zdravila med dojenjem je premalo podatkov, zato uporabo v tem času odsvetujemo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Kapljice za uho vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KAPLJICE ZA UHO

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Način uporabe in odmerjanje

Odrasli: 3 kapljice vkapajte v obolelo uho 3- do 4-krat na dan.

Kapljice si vkapajte tako, da se uležete na stran ali nagnete glavo na stran, da bo obolelo uho obrnjeno navzgor. Nežno povlecite uhelj navzgor (stran od vratu) in nazaj, nato iztisnite ustrezno količino kapljic iz plastenke v uho. Ostanite v tem položaju nekaj časa (2 do 3 minute).

Zdravila Kapljice za uho ne uporabljajte neprekinjeno več kot 5 dni. To zdravilo ni namenjeno dolgotrajni uporabi.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kapljice za uho, kot bi smeli

Podatkov o toksičnih učinkih po prevelikem odmerjanju tega zdravila ni. Če se po prevelikem odmerjanju pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice za uho

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice za uho. Nadaljujte z uporabo zdravila, ko se spomnite.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavljajo pri vseh bolnikih.

Redko se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije ali draženje na mestu uporabe. Ob pojavu vrtoglavice, slabosti ali nehotenih ritmičnih gibov zrkel (nistagmus) takoj prenehajte z uporabo Kapljic za uho, saj so lahko ti neželeni učinki posledica prehajanja lidokaina v notranje uho.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KAPLJICE ZA UHO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte dobro zaprto v originalni ovojnini pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo. Po uporabi plastenko dobro zaprite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in platenki poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Kapljice za uho

1 g (20 kapljic) zdravila Kapljice za uho vsebuje (zdravilni učinkovini):

- 20 mg lidokainijevega klorida (*lidocaini hydrochloridum*),
- 0,4 mg etakridinijevega laktata monohidrata (*ethacridini lactas monohydricus*).

Pomožne snovi so: glicerol (E 422), propilenglikol (E 1520) in prečiščena voda.

Izgled zdravila in vsebina pakiranja

Kapljice za uho so bistra, rumenozelena tekočina, brez vonja. Pakiranje: škatla s kapalno platenko, v kateri je 10 ml raztopine.

Način in režim izdaje zdravila Kapljice za uho

Zdravilo Kapljice za uho je galenski izdelek.

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6
2000 Maribor

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na Službo za regulativo in farmacevtsko kakovost, Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.

Telefon: + 386 (0)2 450 28 00
E-pošta: info@mb-lekarne.si

Datum zadnje revizije besedila:

24. september 2018