

Navodilo za uporabo

# MariDERM

## kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom

42,4 mg/170 mg/5,3 mg v 1 g dermalna raztopina  
salicilna kislina/mlečna kislina/ jod

### Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 12 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

### Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom
3. Kako uporabljati zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### 1. KAJ JE ZDRAVILO MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom vsebuje salicilno kislino, mlečno kislino in jod v kolodiju. Salicilna in mlečna kislina razrahljata stike med odmrli celicami rožene plasti kože, s čimer zmehčata tkivo bradavice, ki se postopoma odluči. Jod deluje protivirusno, protibakterijsko in protiglivično.

MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom uporabljamo za odstranjevanje kožnih bradavic.

To zdravilo je primerno za odrasle in otroke, stare več kot 5 let.

### 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM

Ne uporabljajte zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) salicilno kislino, mlečno kislino, jod ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- pri spremembah, vzbrsteh in izrastkih na koži in sluznicah, ki so neznanega izvora,
- na pigmentnih madežih,
- v okolici genitalij in rektuma, na obrazu ter drugih občutljivih predelih in v primeru izraščanja dlak iz bradavic,
- če je koža pordela, razdražena ali v primeru okužb kože in na nezaceljenih ranah,
- pri otrocih, mlajših od 5 let.

### Opozorila in previdnostni ukrepi

- Če ne poznate izvora nastanka spremembe na koži, se pred uporabo

posvetujte z zdravnikom.

- Če se pojavi pekoče zbadanje ali močno vnetje na mestu uporabe kljub uporabi tega zdravila v skladu z navodili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Posebna previdnost je potrebna v primeru, če imate sladkorno bolezen (diabetes), slabo prekrvavitev ali okvaro živcev okončin (rok in nog).
- Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je namenjeno samo za zunanjo uporabo! Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, usti in sluznicami ter vneto in poškodovano kožo. Če se to zgodi, izpirajte prizadete predele z veliko količino vode. Če je prišlo zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom v oko ali ste ga zaužili, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Dolgotrajno uporabo zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom na večjih površinah kože odsvetujemo.
- Posebna previdnost je potrebna pri uporabi zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom, če ste nagnjeni k preobčutljivostnim reakcijam (seneni nahod, astma).
- Pazite, da vsebine zdravila ne razlijete, saj lahko poškoduje kožo in druge predmete. Če pride vsebina zdravila v stik z oblačili, tkanino, nakitom ali kovinskimi oziroma loščenimi predmeti, jih lahko trajno poškoduje.
- Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je hlapljivo in vnetljivo. Ne uporabljajte ga v neposredni bližini odprtega ognja ali drugih virov vžiga (na primer prižgana cigareta). Izogibajte se vdihavanju hlapov zdravila.

### Otroci in mladostniki

Uporaba tega zdravila ni primerna za otroke, mlajše od 5 let. Tega zdravila ne uporabljajte pri otrocih ali mladostnikih med virusno okužbo ali takoj po njej (na primer gripa, norice).

### Druga zdravila in zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom

Ni poročil o medsebojnem delovanju zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom z drugimi zdravili.

Na mestu uporabe tega zdravila ne uporabljajte sočasno drugih pripravkov za uporabo na koži, razen če zdravnik svetuje drugače.

### Nosečnost in dojenje

Uporabo tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem odsvetujemo.

### 3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

#### **Način uporabe in odmerjanje**

Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom s pomočjo čopiča v zamašku nanesite 1-krat dnevno zvečer pred spanjem na bradavico.

- Pred uporabo tega zdravila z mesta odstranite morebiten obliž in mesto z bradavicami namakajte v topli vodi 5 minut.
- Nato osušite mesto nanosa z uporabo brisače.
- Osušen vrh bradavic previdno podrgnite s pilico ali kamnom za odstranjevanje trde kože, grobo tkanino ali podobnim. Pri tem pazite, da ne poškodujete zdrave kože v okolici bradavice.
- Nanesite zadostno količino tega zdravila, da prekrije bradavice. Pazite, da zdravila ne nanesete na zdravo kožo v okolici bradavic. Okolico mesta uporabe lahko pred nanosom zaščitite z obližem ali mastno negovalno kremo oziroma mazilom, da preprečite morebiten stik zdravila z zdravo kožo.
- Ko se naneseno zdravilo dobro posuši, bradavice, na katere ste nanesli zdravilo, prelepite z obližem.
- Po uporabi stekleničko dobro zaprite.

Če zdravnik ali farmacevt ne svetuje drugače, postopek ponavljajte do odstranitve bradavic, vendar ne več kot 12 tednov. Če v 12 tednih bradavic ne uspete odpraviti ali pride na mesto nanosa do vnetja, se posvetujte z zdravnikom.

Bradavice so nalezljive in se lahko okužijo tudi drugi. Zato vedno uporabljajte le svojo brisačo. Če imate bradavice na spodnjem delu stopala, ne hodite bos. Bradavice se lahko prenesejo tudi z enega dela telesa na drugega.

**Če ste pomotoma nanesli zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom na zdravo kožo,** ga nemudoma obrišite z robčkom in po potrebi sperite.

**Če ste vdihovali večje količine hlapov zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom,** se lahko pojavi omotica. V tem primeru pojdite na sveži zrak.

**Če ste pozabili uporabiti zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom**

Ne skrbite, če ste pozabili uporabiti to zdravilo. Zdravilo uporabite, ko se spomnite.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

### 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V redkih primerih se lahko pojavi alergija na (preobčutljivost za) sestavine zdravila. Kratek čas po uporabi se lahko pojavi rahel pekoč ali zbadajoč občutek na mestu uporabe. V okolici nanosa lahko pride do poškodbe zdrave kože, če je niste zaščitili in ste nanjo pomotoma nanesli to zdravilo.

#### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu

### 5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM

#### **Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C na suhem mestu. Shranjujte dobro zaprto v originalni ovojnini, zaščiteno pred svetlobo in ognjem.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in steklenički poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

### 6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

#### **Kaj vsebuje zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom**

1 ml (0,85 g) dermalne raztopine vsebuje (zdravilne učinkovine):

- 42,4 mg salicilne kisline (*Acidum salicylicum*),
- 170 mg mlečne kisline (*Acidum lacticum*),
- 5,3 mg joda (*Iodum*).

Pomožne snovi so: elastični kolodij (piroksilin, eter, etanol in ricinusovo olje), etanol, eter, kalijev jodid, prečiščena voda.

#### **Izgled zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom in vsebina pakiranja**

MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je bistra, rdečerjava, lahko hlapljiva raztopina, izrazitega vonja po etru.

Pakiranje: škatla z 10 ml dermalne raztopine v temni steklenički z zaporko s čopičem.

#### **Način in režim izdaje zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom**

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je galenski izdelek.

Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na Službo za regulativo in farmacevtsko kakovost proizvajalca, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.

Telefon: 02 450 28 00

E-pošta: info@mb-lekarne.si

#### **Datum zadnje revizije besedila:**

19. oktober 2018