

Navodilo za uporabo

Kukol forte

zdravilno mazilo proti kurjim očesom 400 mg/100 mg v 1 g mazilo
salicilna kislina/mlečna kislina

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 12 v tednih, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Kukol forte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kukol forte
3. Kako uporabljati zdravilo Kukol forte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kukol forte
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KUKOL FORTE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Kukol forte vsebuje salicilno kislino in mlečno kislino v mazilni podlagi. Salicilna in mlečna kislina razrahljata stike med odmrliimi celicami rožene plasti kože ter s postopnim mehčanjem olajšata odstranitev kurjih oces. Salicilna kislina deluje tudi blago protiglivično.

Zdravilo Kukol forte uporabljamo za mehčanje otrdelega tkiva pri kurjih očesih in odebeljenih poroženelih zatrdlinah.

Kurja očesa in zatrdline so trde, debele blazinice kože, ki nastanejo zaradi pritiska in trenja. Običajno se pojavijo na stopalih zaradi neprimerne obutve. Pojavijo se lahko tudi na rokah.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KUKOL FORTE

Ne uporabljajte zdravila Kukol forte:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) salicilno kislino, mlečno kislino ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- pri spremembah, vzbrsteh in izrastkih na koži in sluznicah, ki so neznanega izvora,
- na pigmentnih madežih in materinem znamenju,
- v okolici genitalij in rektuma, na obrazu ter drugih občutljivih predelih (na primer pazduhe, prsi) ter v primeru izraščanja dlak iz bradavic,
- če je koža pordela, razdražena ali v primeru okužb kože in na nezaceljenih ranah,

- če imate sladkorno bolezen,
- če imate slabo prekrvavitev ali okvaro živcev okončin (rok in nog).

Opozorila in previdnostni ukrepi

- Če se pojavi pekoče zbadanje ali močno vnetje na mestu nanosa kljub uporabi tega zdravila v skladu z navodili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Zdravilo Kukol forte je namenjeno **samo za zunanjo uporabo!** Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, usti in sluznicami ter vneto in poškodovano kožo. Če se to zgodi, izpirajte prizadete predele z obilno količino vode. Če je prišlo zdravilo Kukol forte v oko ali ste ga zaužili, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Pazite, da zdravila ne nanese na zdravo kožo, saj jo lahko poškoduje.

Otroci in mladostniki

Uporaba tega zdravila ni priporočljiva pri otrocih, mlajših od 14 let.

Druga zdravila in zdravilo Kukol forte

Ni poročil o medsebojnem delovanju zdravila Kukol forte z drugimi zdravili. Na mestu uporabe tega zdravila ne uporabljajte sočasno drugih pripravkov za uporabo na koži, razen če zdravnik svetuje drugače.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden uporabite to zdravilo. Podatkov o varnosti uporabe tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem ni, zato ga uporabljajte le po posvetu z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Kukol forte vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KUKOL FORTE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Način uporabe in odmerjanje

Zdravilo Kukol forte s pomočjo posebno oblikovanega vratu tube nanosite 1-krat dnevno, običajno zvečer pred spanjem SAMO na mesto uporabe.

- Pred vsako uporabo tega zdravila z mesta nanosa odstranite morebiten obliž.
- Nato osušite mesto nanosa z uporabo brisače.
- Nanesite le takšno količino tega zdravila, da prekrije kurje oko oziroma zatrdlino. Pazite, da zdravila ne nanesete na zdravo kožo v okolici. Zato svetujemo, da okolico mesta uporabe pred nanosom zdravila zaščitite z obližem ali mastno negovalno kremo oziroma mazilom, da preprečite morebiten stik tega zdravila z zdravo kožo.
- Del kože, na katerega ste nanesli to zdravilo, prelepite z obližem.
- Po uporabi tubo zaprite in si temeljito umijte roke!
- Takšen postopek ponavljajte 5 do 7 dni. Po tem obdobju prizadeti del 20 do 30 minut namakajte v raztopini kuhinjske soli in vode ter zmehčani epitel previdno odstranite. Po potrebi celoten postopek ponovite.

Trajanje zdravljenja je odvisno od velikosti in trdovratnosti kurjega očesa oziroma zatrdline. Pomembno je, da vztrajate dovolj dolgo in postopek ponavljajte do odstranitve kurjega očesa oziroma zatrdline, vendar ne več kot 12 tednov, razen če zdravnik ali farmacevt ne svetuje drugače. Če v 12 tednih kurjega očesa ali zatrdline ne uspete odpraviti ali pride na mesto nanosa do vnetja, se posvetujte z zdravnikom.

Če mazilo pomotoma zaide v usta ali oči, lahko pride do poškodbe sluznice. Sperite oči ali usta z obilno količino vode. Če spirate eno oko, pazite, da mazila ne izperete v drugo oko. Nato poiščite zdravniško pomoč.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kukol forte, ne skrbite. Zdravilo uporabite, ko se spomnite.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavljajo pri vseh bolnikih.

V redkih primerih se lahko pojavi alergija na (preobčutljivost za) sestavine zdravila. Kratek čas po nanosu tega zdravila se lahko pojavi rahel pekoč ali zbadajoč občutek na mestu uporabe. V okolici nanosa lahko pride do poškodbe zdrave kože, če je niste zaščitili in ste nanjo pomotoma nanesli to zdravilo.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KUKOL FORTE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte dobro zaprto v originalni ovojnini pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo. Po uporabi plastenko dobro zaprite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in tubi poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Kukol forte

Učinkovini sta salicilna kislina in mlečna kislina.

1 g mazila vsebuje:

- 400 mg salicilne kisline (*Acidum salicylicum*),
- 100 mg mlečne kisline (*Acidum lacticum*).

Pomožna snov je beli vazelin.

Izgled zdravila Kukol forte in vsebina pakiranja

Kukol forte je belo mazilo.

Pakiranje: škatla s 6 g mazila v tubi.

Način in režim izdaje zdravila Kukol forte

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Kukol forte je galenski izdelek.



Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6
2000 Maribor

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na proizvajalca:

Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6,
SI-2000 Maribor.

Telefon: + 386 (0)2 450 28 00

E-pošta: info@mb-lekarne.si

Datum zadnje revizije besedila:

23. september 2019