

Uporaba / Upotreba

Novalac AC je hrana, posebej razvita za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov in majhnih otrok s kolikami v obliki bolečin v trebuhu, vetrov in napihovanja zaradi znižane tolerance na laktozo. Novalac AC ima zmanjšano vsebnost laktoze, kar omejuje fermentacijo v črevesju oziroma pojav bolečin v trebuhu, vetrov in napihovanja. Novalac AC je primeren za dojenčke in majhne otroke od rojstva do 36. meseca starosti, če jih matere ne dojijo. Do 6. meseca starosti se lahko uporablja kot edina prehrana, po 6. mesecu starosti pa lahko Novalac AC po navadni zdravniku uporabljate kot del raznovrstne prehrane. / Novalac AC je hrana, posebno razvijena za zadovoljevanje prehranskih potreb dojenčadi / male djece s kolikami v obliki bolova u trebuhu, vetrova i nadutosti zbog smanjene tolerance na laktozo. Novalac AC ima smanjen sadržaj laktoze što ograničava fermentaciju u crijevima odnosno pojav bolova u trbuhu, vjetrova i nadutosti. Novalac AC primjeren je za dojenčad i malu djecu od rođenja do 36. mjeseca starosti, ako majka ne doji. Novalac AC zadovoljava sve prehranske potrebe dojenčadi do 6. mjeseca starosti, a za dojenčad i malu djecu stariju od 6 mjeseci prema preporuci liječnika dio je raznolike prehrane.

Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Novalac AC uporabljate samo pod zdravniškim nadzorom pri dojenčkih in majhnih otrocih, ki imajo simptome, za katere je živilo namenjeno. Proizvoda ne smete uporabljati kot edini vir hrane po 6. mesecu starosti in/ali v primeru galaktozemije. Posebna pozornost je potrebna tudi pri dojenčkih z oslabiljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Proizvod ni primeren za parenteralno uporabo ali za hranjenje po sondi. Pakirano v kontrolirani atmosferi. / *Majčino mleko najboljša je hrana za dojenčad. Novalac AC se mora uzimati pod liječničkim nadzorom i davati samo dojenčadi i maloj djeci koja pokazuje simptome kolikama. Proizvod nije primjeren za uzimanje kao jedini izvor prehrane nakon 6. mjeseca starosti i/ili u primeru galaktozeimije. Poseban oprez je potreban i kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođeničadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik za zdravje. Proizvod nije primjeren za parenteralnu uporabu. Novalac AC nije prikladan za hranjenje putem sonde. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.*

Odmerjanje / Doziranje

Starost dojenčca ali majhnega otroka (mesece) / Starost dojenčeta ili malog djeteta (mjeseci)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Število obrokov na dan/ Broj obroka na dan	6	5	5	4	3*	2*
Število meric za pripravo enega obroka/ Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3	4	5	7	7	8
Količina vode (ml) / Količina vode (ml)	90	120	150	210	210	240

*Kot del raznolike prehrane/ Kao dio raznolike prehrane

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca AC. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite starosti dojenčca ali majhnega otroka in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoševajte priporočila v tabeli. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca AC. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta ili malog djeteta. Ako Vam liječnik nije drugačije savjetovao, držite se preporuke u tablici.

Vedno pripravite svež obrok. • Hranite na suhem in hladnem mestu, zaščiteno pred svetlobo. • Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjenega na dnu pločevinke. • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite. • Ne shranjujte nepoptote obroka. Ostanek zavrzite. / Uvijek pripremite sveži obrok. • Čuvajte na suhom mjestu, zaštiteno od svjetla i topline. • Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otišnutog na dnu limenke. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna. • Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostanak bacite.

Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švicarska
Distributer: Medis, d.o.o., Bmičeva 1, Ljubljana
Sjedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska
Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb
Kontakt za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH.
Uvoznik za BA: Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500.
Broj i datum rješenja u FBiH: Broj rješenja u upisu u Registar RS:
Proizvedeno v EU/Proizvedeno u EU.



Novalac AC

Živilo za posebne zdravstvene namene
Za prehransko uravnavanje kolik v obliki
bolečin v trebuhu, vetrov in napihovanja

Hrana za posebne medicinske potrebe
Za dijetalnu prehrano dojenčadi
s kolikami v obliki bolova u
trbuhu, vjetrova i nadutosti



Zmanjšana vsebnost laktoze/
Smanjen sadržaj laktoze

0-36 mesecev/
mjeseci

400 g e

Hranilna vrednost / Hranljiva vrijednost

	100 g	100 ml
Energijska vrednost/Energetska vrijednost		
	kJ	2095
	kcal	500
Maščobe/Masti	g	25
- od tega nasičene maščobe/		
- od kojih zasićene masne kiseline	g	10,5
- linolna kislina/linolna kiselina	g	4,5
- alfa linolenska kislina/alfa linolenska kiselina	mg	405
- DHA (dokozahexaenojska kislina/		
- dokozahexaenojska kiselina)	mg	120
- ARA (arahidonska kislina/arahidonska kiselina)	mg	30
Ogljikovi hidrati / Ugljikohidrati	g	57,5
- od tega sladkorji / od kojih šećeri	g	2,9
laktoza	g	18
GOS (galakto-oligosaharidi)	g	1,85
Prehranske vlaknine / Vlakna	g	1,2
Beljakovine / Bjelancevine	g	10,4
Sol	g	0,475
Vitamins		
A	µg	440
D	µg	12
E	mg	11
K	µg	70
C	mg	70
Tiamin	mg	0,9
Riboflavin	mg	1,2
Niacin	mg	5
B6	mg	0,5
Folna kislina / Folna kiselina	µg	85
Folat	µg	150
B12	µg	1,6
Biotin	µg	24
Pantotenska kislina / Pantotenska kiselina	mg	5
Minerali		
Natrij	mg	190
Kalij	mg	590
Klorid	mg	400
Kalcij	mg	500
Fosfor	mg	310
Magnezij	mg	40
Železo / Željezo	mg	5
Cink	mg	3,5
Baker / Bakar	mg	0,38
Mangan	mg	0,035
Fluorid	mg	<0,45
Selen	µg	26
Krom	µg	<45
Molibden	µg	<45
Jod	µg	95
Inozitol / Kolini	mg	170
Holin	mg	80
Taurin / Taurin	mg	40
L-karnitin	mg	20

Sestavine / Sastojci

Posneto mleko, maltodekstrini, rastlinska olja (palmovo, sojino, kokosovo, repično), galakto-oligosaharidi (mleko), laktoza (mleko), ribje olje (DHA), trikalcijev citrat, kolini bitartrat, emulgator (sojin lecitin), trikalcijev citrat, dinatrijev fosfat, vitamini (natrijev askorbat, DL-alfa-tokoferil acetat, piridoksinamid, kalcijev D-pantotemat, tiaminjev hidroklorid, riboflavin, retinil acetat, piridoksinjev hidroklorid, folna kislina, fitomenadiol, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin), natrijev klorid, trimagnezijev citrat, železov pirofosfat, inozitol, L-cistin, L-tryptofan, mlečne kulture (B. lactis, L. rhamnosus GG), kalcijev klorid, taurin, olje iz glave Mortierella alpina (ARA), kalcijev hidrokسيد, dikalcijev fosfat, L-karnitin, magnezijev klorid, cinkov sulfat, antioksidanti (izvleček bogat s tokoferoli, askorbil palmitat), natrijev selenit, kalcijev jodid, bakrov sulfat, cinkov sulfat, / Odrano mlečko, maltodekstrini, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo, repično), galakto-oligosaharidi (mleko), laktoza (mleko), riblje ulje (DHA), trikalcijev citrat, kolini bitartrat, emulgator (sojin lecitin), trikalcijev citrat, dinatrijev fosfat, vitamini (natrijev askorbat, DL-alfa-tokoferil acetat, piridoksinamid, kalcijev D-pantotemat, tiaminjev hidroklorid, riboflavin, retinil acetat, piridoksin-hidroklorid, folna kiselina, fitomenadiol, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin), natrijev klorid, trimagnezijev citrat, železov pirofosfat, inozitol, L-cistin, L-tryptofan, mliječne kulture (B. lactis, L. rhamnosus GG), taurin, ulje gljive Mortierella alpina (ARA), kalcijev hidrokسيد, dikalcijev fosfat, L-karnitin, magnezijev klorid, cinkov sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima, askorbil palmitat), natrijev selenit, kalcijev jodid, bakrov sulfat, manganov sulfat.

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.

- Stekleničko in pokrovec z dudo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu i poklopac sa dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.
- Vodu za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivnom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
- Vodu u lončku ohladite na 40 °C in jo preljejte v stekleničko. / Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i preljejte je u bočicu.
- V stekleničko s priloženo merico vsujete predpisano število meric. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.
- Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.
- Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C) oz. dokler na koži ne čutite ne topla ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlačnog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.